

Correction du test 1

Exercice 1 :

Donner en justifiant la nature (convergente ou divergente) des intégrales :

1.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2}.$$

Une primitive de $t \mapsto \frac{1}{1+t^2}$ sur \mathbb{R} est $t \mapsto \arctan(t)$, dont les limites en $+\infty$ et $-\infty$ sont respectivement $\frac{\pi}{2}$ et $-\frac{\pi}{2}$. Donc $t \mapsto \frac{1}{1+t^2}$ est intégrable sur \mathbb{R} (d'intégrale π).

2.

$$\int_0^1 \ln(x) dx.$$

Une primitive de \ln sur \mathbb{R}_+^* est $x \mapsto x \ln(x) - x$, qui est continue sur \mathbb{R}_+^* , de limite 0 en 0. Donc \ln est intégrable sur $]0, 1]$ (d'intégrale -1).

3.

$$\int_0^{+\infty} \cos(t) dt.$$

Une primitive de \cos sur \mathbb{R}_+ est \sin , qui n'a pas de limite en $+\infty$. Donc \cos n'est pas intégrable au voisinage de $+\infty$.

4.

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} dt$$

(Inutile d'espérer avoir une primitive de cette fonction!). L'application $f: t \mapsto \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}}$ est continue sur \mathbb{R}_+^* . Il faut étudier la fonction au voisinage de 0 et $+\infty$ pour voir si elle est intégrable.

en 0 : On a $e^{-t} \xrightarrow[t \rightarrow 0]{} 1$. Donc $f \sim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{t}}$, dont on sait qu'elle est intégrable au voisinage de 0 (disons sur $]0, 1]$, par exemple une primitive de $t \mapsto \frac{1}{\sqrt{t}}$ est $t \mapsto 2\sqrt{t}$ qui a une limite finie en 0). Donc f est intégrable sur $]0, 1]$

en $+\infty$: Sur $[1, +\infty[$, on a $\frac{1}{\sqrt{t}} \leq 1$, donc $\frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} \leq e^{-t}$, dont on sait qu'elle est intégrable sur $[1, +\infty[$. Donc f est aussi intégrable sur $[1, +\infty[$, et donc sur $]0, +\infty[$

Exercice 2 :

Soit F la fonction définie sur $[0, +\infty[$ par

$$F(x) = \int_0^1 \ln(1 + xe^t) dt.$$

1. Montrer que F est dérivable sur $[0, +\infty[$.

On note f l'application définie par

$$f: \mathbb{R}_+ \times [0, 1] \longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, t) \longmapsto \ln(1 + xe^t)$$

Alors :

- f est intégrable par rapport à t pour tout $x \in \mathbb{R}_+$.
- f est dérivable par rapport à x sur \mathbb{R}_+ pour tout $t \in [0, 1]$.
- Pour tout $(x, t) \in \mathbb{R}_+ \times [0, 1]$,

$$|\partial_x f(x, t)| = \left| \frac{e^t}{1 + xe^t} \right| \leq e^t,$$

qui est intégrable sur $[0, 1]$.

Donc d'après le théorème de dérivation des intégrales à paramètres, F est dérivable sur \mathbb{R}_+ et

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, F'(x) = \int_0^1 \frac{e^t}{1 + xe^t} dt.$$

2. Donner une expression sans intégrale de $F'(x)$ pour tout $x \in [0, +\infty[$.

On a, pour $x \in \mathbb{R}_+^*$:

$$F'(x) = \int_0^1 \frac{e^t}{1 + xe^t} dt = \frac{1}{x} \int_0^1 \frac{xe^t}{1 + xe^t} dt = \frac{1}{x} [\ln(1 + xe^t)]_0^1 = \frac{1}{x} \ln \left(\frac{1 + xe}{1 + x} \right)$$

et

$$F'(0) = \int_0^1 e^t dt = e - 1$$